

أربيبكير أقراص

(١٠ مجم أربيبزرؤل و ٢٠ مجم أربيبزرؤل)

أقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنه يحتوي على معلومات مهمة لك.

- احتفظ بهذه النشرة قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى أسأل طبيبك أو الصيدلي.
- ما وصف هذا الدواء أنه لا فقط لا تتلفها للأخريين قد يضرهم ، حتى لو كانت أعراض مرضهم هي نفس أعراضك.
- إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية ، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي وهذا يشمل أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. انظر القسم ٤
- ما هي المعلومات الموجودة في هذه النشرة ؟**
- ١. ما هو أربيبزركير وما هي دواعي استعماله
- ٢. ما يجب أن تعرفه قبل تناول أربيبزركير
- ٣. كيف تأخذ أربيبزركير
- ٤. الآثار الجانبية المحتملة
- ٥. كيفية تخزين أربيبزركير
- ٦. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

١. ما هو أربيبزركير وما هي دواعي استعماله؟

يحتوي أربيبزركير على المادة الفعالة أربيبزرؤل وينتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى مُضادَات الألمهان. يتم استخدامه لعلاج الألمين والماهقين الذين تبلغ أعمارهم ١٥ عامًا وأكثر والذين يعانون من مرض يتميز بأعراض مثل نفاخ أو روية أو الإحساس بأشياء غير موجودة ، مثلًا ، التشنج ، المتعذبات الخاطئة ، الكلام والسلوك الغير مرتبط ، والرثابة العاطفية. قد يشعر أيضًا الأشخاص المصابون بهذه الحالة بالاكنتاب والشعور بالذنب وبالقلق بالوتوتر. يستخدم أربيبزركير لعلاج الألمين والماهقين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٢ عامًا فما فوق والذين يعانون من حالة مصحوبة بأعراض مثل الشعور «بالنشوة» ، بالطفقة المفرطة ، بالحاجة إلى نوم أقل بكثير من المعتاد ، التحدث بسرعة كبيرة مع وجود أفكار متسارعة ، والتعب الشديد في بعض الأحيان. وفي البالغين يمنع أيضًا الأريببزركير عودة هذه الحالة في المرضى الذين استجلبوا العلاج بالآبيبزركير.

٢. ما يجب أن تعرفه قبل تناول أربيبزركير؟

• إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أربيبزرؤل أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المدرجة في القسم ٨).

التحذيرات والتحذاتبات

تحدث إلى طبيبك قبل تناول أربيبزركير.
تم الإبلاغ عن أفكار وسلوكيات انتحارية أثناء علاج أربيبزرؤل. أخبر طبيبك على الفور إذا كان لديك أي أفكار أو مشاعر حول إيذاء نفسك.
قبل العلاج بالآريببزركير ، أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من:
• ارتفاع نسبة السكر في الدم (يتميز بأعراض مثل العطش الشديد ، وخروج كميات كبيرة من البول ، وزيادة الشهية والشعور بالضعف) ، ووجود تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري
• نوبات (قد يرغب طبيبك في مراقبتك عن بعناية وعن كثب)
• حركات عشلية لا إرادية وغير منتظمة ، خاصة في الوجه.
• أمراض القلب والأوعية الدموية (الدورة الدموية) ، والتاريخ العائلي لأمراض القلب والأوعية الدموية ، والسكتة الدماغية أو «السكتة الدماغية الصغيرة» ، وضغط الدم الغير الطبيعي.
• جلطات دموية أو تاريخ عائلي للجلطات الدموية ، حيث ارتبطت مضادات الأذهان بتكوين جلطات دموية

• دواعي غير معتادة و تجارب سابقة مثل المفازمة المفرطة.

إذا لاحظت زيادة في وزنك ، أو وجود حركات عشلية غير عادية ، أو تعاني من نعاس يؤثر ويتعارض مع الأنشطة اليومية العادية ، أو لاحظت أي صعوبة في البلع أو بأعراض الحساسية ، يرجى إخبار طبيبك.

إذا كنت مريضًا مسبقًا وتعالتي من الحزف (فقدان الذاكرة والقدرات العقلية الأخرى) ، يجب عليك أنت أو قريبك إخبار طبيبك إذا كنت قد أصبت بمسكة دماغية أو سكتة دماغية «صغيرة». (احتمالية حدوث وفاة للمرضى كبار السن الذين يعانون من خرف مرتبط بالذهان).

أخبر طبيبك على الفور إذا كان لديك أي أفكار أو مشاعر حول إيذاء نفسك.

تم الإبلاغ عن أفكار وسلوكيات انتحارية أثناء العلاج بالآريببزرؤل.

أخبر طبيبك على الفور إذا كنت تعاني من تصلب أو عدم مرونة بالعضلات مع ارتفاع في درجة الحرارة أو تغير الحالة العقلية أو ضربات سريعة أو غير منتظمة بالقلب.
أخبر طبيبك إذا لاحظت أو عانيتك ، فقد المدة الزمنية أنك تقوم بتطوير دواعي أو اشتها للتصرف بطرق غير معتادة بالنسبة لك ولا يمكنك مقاومة الدافع للقيام بأشعة معينة يمكن أن تؤذي نفسك أو الآخرين. وتسمى هذه اضطرابات السيطرة على الانفعالات ويمكن أن تشمل سلوكيات مثل الإدمان على القمار أو الأكل أو الإنفاق المفرط أو الدافع الجنسي المرتفع بشكل غير طبيعي أو الانشغال بزيادة الأفكار أو المشاعر الجنسية.

قد يحتاج طبيبك إلى تعديل أو إيقاف جر عتك.

قد يسبب أربيبزرؤل النعاس ، وانخفاض ضغط الدم عند الوقوف ، والدوخة وتغيرات في قدرتك على الحركة والتوازن ، مما قد يؤدي إلى السقوط يجب توخي الحذر ، خاصة إذا كنت مريضًا مسبقًا أو لديك بعض الوهن.

الأطفال والمراهقون

لا تستخدم هذا الدواء لدى الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن ١٣ عامًا. من غير المعروف ما إذا كانت أمنة وفعالة عند هؤلاء المرضى.

أدوية أخرى و أربيببزركير

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تتناول مؤخرًا أو قد تتناول أي أدوية أخرى ، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية.
لا تستخدم هذا الدواء إذا قد تزيد أربيبزركير من تأثير الأدوية المستخدمة لخفض ضغط الدم. تأكد من إخبار طبيبك إذا كنت تتناول دواء لإفهاء ضغط دمك تحت السيطرة.
قد يمتد تناول أربيببزركير مع بعض الأدوية أن الطبيب سيحتاج إلى تغيير جرعتك من أربيبزركير أو الأدوية الأخرى. من المهم بشكل خاص أن تذكر ما يلي لطبيبك:
• أدوية تصحيح إيقاع القلب (مثل كيكيدين ، أمودارون ، فليكاينيد)
• مضادات الاكتئاب أو العلاجات العشبية المستخدمة لعلاج الاكتئاب والقلق (مثل فلوكتسين ،

باروكستين ، فينلافكسين ، نيتة سانت جون)

- الأدوية المضادة للطفريات (مثل كيتوكونازول ، إيتراكونازول)
- أدوية معينة لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية (مثل إيفافيرينز ، نيفيرابين ، مثبطات الأترسيم البروتينسي مثل إيندينايفر ، ريتونايفر)
- مضادات الاختلاج (التشنجات) المستخدمة لعلاج الصرع (مثل كاربامازيبين ، الفينيتوين ، الفينوباربيتال)

بعض المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج مرض السل (ريفامبين ، ريفاميسين)

قد تزيد هذه الأدوية من خطر الآثار الجانبية أو تقلل من تأثير أربيببزركير ، إذا ظهرت عليك أي أعراض غير عادية عند تناول أي من هذه الأدوية مع أربيببزركير ، يجب عليك مراجعة طبيبك.
عادةً ما تستخدم الأدوية التي تزيد من مستوى السيروتونين في حالات تشمل الاكتئاب واضطراب القلق الشديد واضطراب الوسواس القهري والذهاب الاجتماعي بالإضافة إلى الصداع النصفي والأمم.
• أدوية التريتانز والثرامالون والتريوفان المستخدمة في حالات تشمل الاكتئاب واضطراب القلق العام واضطراب الوسواس القهري والذهاب الاجتماعي وكذلك الصداع النصفي والأمم • مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (مثل باروكستين وفلوكتسين) المستخدمة للاكتئاب والوسواس القهري والذعر والقلق
• مضادات الاكتئاب الأخرى (مثل فينلافكسين وترييوفان) المستخدمة في حالات الاكتئاب الشديد

• ثلاثي الهلقات (مثل كلوميبرامين وأميترينيتلين) المستخدمة لمرض الاكتئاب
• نيتة سانت جون التي تستخدم كعلاج عشبي للاكتئاب الخفيف
• مسكنات الألم (مثل ترامادول وبيبين) المستخدمة لتسكين الألم
• أدوية التريتانز (مثل سوماتريبتان وزولميتريتان) المستخدمة في علاج الصداع النصفي
قد تزيد هذه الأدوية من خطر الآثار الجانبية. إذا كنت تعاني من أي أعراض غير عادية عند تناول أي من هذه الأدوية مع أربيببزركير ، يجب عليك مراجعة طبيبك.

تنوُّق الطعام والشراب والكحول

يمكن تناول هذا الدواء بعض النظر عن وجبات الطعام.

يجب تجنب الكحول.

الحمل والرضاعة والحساسية

إذا كنت حاملًا أو مرضعة ، فتعقدين أنك حامل أو تخططين لإنتاج طفل ، أسألي طبيبك للحصول على المشورة قبل تناول هذا الدواء.
قد تحدث الأعراض التالية عند الأطفال حديثي الولادة ، من الأمهات اللاتي استخدمن أربيببزركير في الأشهر التالية الأخيرة (الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل): رجفان ، نفاخ و أوجع البطن ، ضعف العضلات ، النعاس ، هياج ، ومشاكل التنفس ، وصعوبة الرضاعة. إذا أصيب طفلك بأي من هذه الأعراض ، فقد تحتاج إلى الاتصال بطبيبك.
تفاوتت حدة هذه المضاعفات ، وفي بعض الحالات كانت الأعراض محدودة ذاتيًا ، في حالات أخرى استعد دعم وحدة العناية المركزة وإطالة الاستشفاء.
أخبر طبيبك هذه المضاعفات أثناء الحمل فقط إذا كانت التواءات المحتملة تفوق المخاطر المحتملة على الجنين.

إذا كنتي تتناولِي أربيببزركير ، سوف يناقش طبيبك معك ما إذا كان يجب عليكِي الرضاعة الطبيعية مع الأخذ في الاعتبار فائدة علاجاك والقاعدة التي تعود على طفلك من الرضاعة الطبيعية. يجب عدم القيام بكلاهما معًا. تحدثي إلى طبيبك حول أفضل طريقة لرضاع طفلك إذا كنتي ترضعين هذا الدواء.
القيادة واستعمال الماكينات

قد تحدث مشاكل في الرؤية والدوخة أثناء العلاج بهذا الدواء (انظر القسم ٤)

يجب مراعاة ذلك في الحالات التي تتطلب اليقظة الكاملة ، على سبيل المثال عند قيادة السيارة أو استخدام الآلات والمكينات.

يحتوي أربيببزركير على اللاكتوز

إذا أخبرتك طبيبك أن لديك حساسية تجاه بعض السكريات ، فاقصص بطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

٣. كيف تأخذ أربيببزركير

احرص دائمًا على تناول هذا الدواء تمامًا كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.
الجرعة الموصى بها للبالغين هي ١٥ مجم مرة في اليوم. ومع ذلك ، قد يصف طبيبك جرعة أقل أو أعلى بعد أقصى ٣٠ مجم مرة في اليوم.

استخدم في الأطفال والمراهقين

يمكن زيادة امتنع طوي (شكل محلول فوي (سال)) بجرعة منخفضة.
يمكن زيادة الجرعة تدريجيًا إلى **الجرعة الموصى بها للمراهقين وهي ١٠ مجم مرة في يوم** ومع ذلك ، قد يصف طبيبك جرعة أقل أو أعلى بعد أقصى ٣٠ مجم مرة في اليوم. إذا كان لديك انطباع بأن تأثير أربيببزركير قوي جدًا أو ضعيف جدًا ، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي.

حاول أن تأخذ أربيببزركير في نفس الوقت كل يوم. لا يهم ما إذا كنت تتناولوه مع أو بدون طعام. تناول القصر دائمًا مع الماء وابتلعه بالكامل.
حتى لو شعرت بتحسن ، لا تغير أو توقف الجرعة اليومية من أربيببزركير دون استشارة طبيبك أولاً.

إذا كنت تأخذ أربيببزركير أكثر مما ينبغي

إذا أدركت أنك قد أخذت أربيببزركير أكثر مما أوصى به طبيبك (أو إذا أخذ شخص آخر بعضًا من أربيببزركير الخاص بك) ، فاقصص بطبيبك على الفور. إذا لم تتمكن من الوصول إلى طبيبك ، فانتقل إلى أقرب مستشفى وخذ علبة الدواء معك.
المرضى الذين تناولوا الكثير من أربيببزركير علوا من الأعراض التالية:
• سرعة ضربات القلب ، والشعور بالهياج والغثاوية ، ومشاكل في الكلام.
• حركات غير عادية (خاصة بالوجه أو باللسان) وانخفاض مستوى الوعي.

قد تشمل الأعراض الأخرى:

- ارتباك ، عدم الاتزان ، غيبوبة ، مزيج من الحمى ، سرعة في التنفس ، تعرق ،
- تصلب العضلات ، النعاس ، بهاء في التنفس ، الاحتقان ، ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم ،
- عدم انتظام ضربات القلب.
- اتصل بطبيبك أو المستشفى على الفور إذا واجهت أيًا مما سبق.
- إذا **نسيتم أن تأخذ أربيببزركير**
- إذا فتنك جرعة ، خذ الجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرن ولكن لا تأخذ جرعتين في يوم واحد.

إذا توقفت عن تناول أربيببزركير

لا توقف عن علاجك بمجرد أنك تشعر بتحسن. من المهم أن تستمر في تناول أربيببزركير طالما أخبرك لمعدتك بذلك.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء ، أسأل طبيبك أو الصيدلي.

٤. الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية ، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارًا جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع.

أعراض جانبية شائعة (قد تظهر لدى حتى ١ من كل ١٠ أشخاص):

- مرض السكري.
- مرض في النوم.
- الشعور بالقلق.
- الشعور بالضعف وصعوبة في الجلوس.
- الشعور بالتوتر الداخلي / عدم راحة والحاجة إلى الحركة (كاكتيبيا).
- ارتجاش أو لفنجات أو حركات متوتلة لا يمكن السيطرة عليها.
- صداع الرأس.
- التعب.
- الدوار.
- عدم وضوح الرؤية.
- انخفاض معدل أو صعوبة في حركات الأمعاء.
- عسر الهضم.
- الشعور بالغثاين.
- زيادة التعب في المم عن المعتاد.
- اليقي.
- الشعور بالتعب.

أعراض جانبية غير شائعة (قد تظهر لدى حتى ١ من كل ١٠٠ شخص):

- زيادة مستويات هرمون البرولاكتين في الدم.
- ارتفاع نسبة السكر في الدم.
- اكتئاب.
- تغير أو زيادة الاهتمام الجنسي.
- حركات الفم واللسان والأطراف التي لا يمكن السيطرة عليها (خلل الحركة المتأخر) ،
- اضطراب العضلات الذي يسبب حركات التواء (خلل التوتر العضلي) ،
- اضطراب في الساقين ،
- رؤية مزدوجة،
- حساسية العين للنمو.
- سرعة ضربات القلب ،
- انخفاض في ضغط الدم عند الوقوف مما يسبب الدوار أو الدوخة أو الإغماء.
- الفاق.
- تم الإبلاغ عن الآثار الجانبية التالية منذ تسويق عقار أربيببزرؤل عن طريق القدم ولكن معدل حدوثها غير معروف:
- انخفاض مستوى خلايا الدم البيضاء.
- انخفاض مستويات الصفائح الدموية.
- رد فعل تحسسي (مثل تورم القدم واللسان والوجه والحنق والحكة والتشرى (طفح جلدي حاد)).
- ظهور أو تفاقم مرض السكري ، الحماض الكيتوني (الكيتونات في الدم والبول) أو الغيبوبة.
- ارتفاع نسبة السكر في الدم.
- نقص الصوديوم في الدم.
- فقدان الشهية،
- فقدان الوزن،
- زيادة الوزن،
- أفكار انتحارية أومحاوله الانتحار ،
- الشعور بالعدوانية ،
- الإثارة ،
- العصبية ،
- مزيج من الحمى وتيبس العضلات وسرعة التنفس والتعرق وانخفاض الوعي والتغيرات المعاجنة في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والإغماء (المفازمة الخطيرة للذهان).
- نوبة،
- والشعور بالسكر ، والحمى ، والتعرق أو تصلب العضلات)،
- اضطراب الكبد،
- تنتيب مثل العيون في موضع واحد ،
- الموت المفاجي جرير المرور ،
- عدم انتظام ضربات القلب ،
- نوبة قلبية،
- تباطؤ ضربات القلب ،
- تجلط الدم في الأوردة وخاصة في الساقين (تشمل الأعراض التورم والألم والاحمرار في الساق) ، والتي قد تنتقل عبر الأوعية الدموية إلى الرئتين مسببة ألامًا في الصدر وصعوبة في التنفس (إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض ، فاطلب المساعدة الطبية نصيحة على الفور) ،
- ضعف مد مرتفع،
- التهاب الشغائتي للطحلم مع خطر الإصابة بالتهاب الرئوي (عدوى الرئة) ،
- تنسج العنقاني حول الحنجرة.
- التهاب البنكرياس.
- صعوبة البلع.
- إسهال،
- عدم الراحة في البطن،
- عدم الراحة في المعدة.
- فشل الكبد.

- التهاب الكبد.
- اصفرار الجلد وبياض جزء من العينين.
- تقارير عن تفتح غير طبيعية لاختبارات الكبد.
- الطفح الجلدي،
- حساسية الجلد للنمو.
- الصلع ،
- التعرق المفرط.

تفاعلات حساسية خطيرة مثل تفاعل الدواء مع فرط الحماضات والأعراض الجهازية (DRESS) حيث يظهر في البداية كأعراض شبيهة بالإنفلونزا مع ظهور طفح جلدي على الوجه ثم طفح جلدي ممتد ، وارتفاع درجة الحرارة ، وتضخم الغدد الليمفاوية ، وزيادة مستويات إنزيمات الكبد التي تظهر في اختبارات الدم وزيادة نوع من خلايا الدم البيضاء (كثرة اليوزينيات).

إنهيار عضلي غير طبيعي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الكلى.

- كلم عضلي،
- تيبس
- التبول اللاارادي (سلس البول) ،
- صعوبة في التبول.
- أعراض الانتساب عند الأطفال حديثي الولادة في حالة التعرض أثناء الحمل ،
- الانتصاب لفترات طويلة و/أو مؤلمة ،
- صعوبة التحكم في درجة حرارة الجسم الأساسية أو ارتفاع درجة الحرارة.
- الامبالسر،
- تورم القدم أو الكاحلين أو القدمين ،
- في فحوصات الدم: زيادة أو تنبذب نسبة السكر في الدم ، زيادة الليمولوجويين الجليكوزيلاتي.
- عدم القدرة على مقاومة الدافع للقيام بعمل قد يكون ضارًا بك أو بالآخرين ، والتي قد تشمل:

دافع قوي للمقاومة المفرطة على الرغم من العواقب الشخصية والعائلية الخطيرة
تغير أو زيادة الاهتمام الجنسي والسلوك الذي يثير قلقًا كبيرًا لك أو للآخرين ، على سبيل المثال ، الدافع الجنسي المتزايد.
• التسوق المفرط الذي لا يمكن السيطرة عليه.
• الأكل بنهم (تناول كميات كبيرة من الطعام في فترة زمنية قصيرة) أو الأكل القهري (تناول طعام أكثر من المعتاد وأكثر مما هو متطابق لإشباع جوعك)
• الميل إلى الشرور والعزلة.

أخبر طبيبك إذا واجهت أيًا من هذه السلوكيات ؛ سيناقش طرق إدارة أو تقليل الأعراض.
في المرضى المسنين المصابين بالخرف ، تم الإبلاغ عن المزيد من الحالات الميمية أثناء تناول عقار أربيببزرؤل. بالإضافة إلى ذلك ، تم الإبلاغ عن حالات سكتة دماغية أو سكتة دماغية «صغيرة».

أعراض جانبية إضافية لدى الأطفال والمراهقين
عائلي المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين ١٢ عامًا وما فوق من آثار جانبية مماثلة من حيث التكرار والنوع لتلك الموجودة لدى البالغين باستثناء أن النعاس وحركات الارتعاش والارتجاش التي لا يمكن السيطرة عليها والأرق والتعب كانت شائعة جدًا (أكثر من ١ من كل ١٠ مرضى) وآلام في الجزء العلوي من البطن ، كان جفاف الفم ، وزيادة معدل ضربات القلب ، وزيادة الوزن ، وزيادة الشهية ، وارتعاش العضلات ، وحركات الأطراف غير المنتظمة ، والشعور بالدوار ، خاصة عند النهوض من وضعية الاستلقاء أو الجلوس ، شائعة (أكثر من ١ من كل ١٠٠ مريض).

الإبلاغ عن الآثار العصبية

إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية ، تحدث إلى طبيبك. يتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غير متكررة في هذه النشرة. يمكنك أيضًا الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرةً إلى مركز اليقظة الدوائي المصري مباشرةً أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى:

- “pv.report@edagegypt.gov.eg”
- أو إلى مركز اليقظة الدوائية الخاص بالشركة عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى pv@multicare-eg.com
- كيفية تخزين أربيببزركير

احفظ هذا الدواء بعيدًا عن أنظار ومتناول أيدي الأطفال.

لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الشريط والعلبة بعد “EXP”.

يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يحفظ أربيببزركير في درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة مئوية في مكان جاف لا تتخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو التفتيات المنزلية. أسأل الصيدلي كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. ستساعد هذه الإجراءات في حماية البيئة.

مدة الصلاحية:

- **أريبببزركير ١٠ مجم :** ثلاثة أعوام
- **أريبببزركير ٢٠ مجم :** ثلاثة أعوام
- ٦. **محتامم العبوة ومعلومات أخرى**
- أريبببزركير ١٠ مجم**
- المادة الفعالة:** أربيببزرؤل ١٠ مجم
- المكونات الغير فعالة:** بنشأ الشرة، هيدروكسي بروبييل السليلوز ، مونوهدرات اللاكتوز وكروسفيديون ، كروسكارميلوز الصوديوم ، وميكروكريستالات السليلوز ، ستيرات المغنيسيوم.
- أريبببزركير ٢٠ مجم**
- المادة الفعالة:** أربيببزرؤل ٢٠ مجم
- المكونات الغير فعالة:** نشأ الشرة، هيدروكسي بروبييل السليلوز (E5)، مونوهدرات اللاكتوز ،جليكولات نشأ الصوديوم. (أفيسيل ١٠٢) ، السليلوز ، ستيرات المغنيسيوم، ثنائي أكسيد السيليكون الغروي (إبروسيل ٢٠٠).
- ما شكل أريبببزركير وما هي محتويات العبوة**
- أريبببزركير ١٠ مجم :** عبوة كرتون بها ١ ٢ أو ٣ شريط من (الألومنيوم) بي في سي (ألومنيوم المعتم) ١٠ أقراص ونشرة داخلية.
- أريبببزركير ٢٠ مجم :** عبوة كرتون بها شريطين من (الألومنيوم) بي في سي الأبيض (المعتم) ١٠ أقراص ونشرة داخلية.

إنتاج شركة مالتني كير إيجيبت للصناعات الدوائية